

## Synonymische Bemerkungen.

1. Von *Aleochara procera* Er. und *spadicea* Er. waren Erichson und mir nur wenige Stücke bekannt, welche Erichson noch als *Ocalea*-Arten beschrieb, ich zu *Aleochara* stellte. Fauvel's Angabe, daß beide Arten nur eine sei (Revue entom. 1888, p. 241), halte ich für begründet.

2. Mit meiner *Aloconota debilicornis* ist nach Hrn. Dr. Eppelsheim *Aloc. planifrons* Waterh. Sharp. identisch, von welcher mir keine Ex. vorgelegen haben.

3. Ein von Märkel stammendes Ex. der *Liogluta hypnorum* Ksw. meiner Sammlung erklärte Hr. Dr. Eppelsheim für identisch mit der Art, die später von Fufs als *sylicola* beschrieben ist. Typische Stücke der *hypnorum* habe ich nicht besessen. Männchen mit einem Höckerchen auf dem zweiten oberen Segment fanden sich bei mir nicht vor; sie haben mir seiner Zeit wahrscheinlich aus anderen Sammlungen vorgelegen und sind mit Unrecht zu *hypnorum* gezogen worden; ich habe schon damals (Ins. Deutschl. II, p. 203 unten) hervorgehoben, daß dergl. in der Regel vorhanden sind, ein Ausdruck, den ich heut kaum anwenden würde, da solche Geschlechtsunterschiede constant aufzutreten pflegen.

4. *Lithocharis sicula* Krtz. (Ins. Deutschl. II, p. 717) ist nach kräftig punktirten Stücken der kurzflügeligen Form der *nigritula* Er. beschrieben, von der mir seiner Zeit ungenügendes Material vorlag; *nigritula* variiert nicht unerheblich in der Länge der Fld.<sup>1)</sup> Nach einem bairischen Stück mit nicht schwarzbraunen, sondern kastanienbraunen Fld. ist *Lithoch. castanoptera* (Ins. Deutschl. II, p. 716) beschrieben; mir ist sonst kein weiteres aus Deutschland vorgekommen; der Käfer soll sich aber (nach Schilsky) auch im Allergbiet und Schlesien finden.

5. Mein einziges Ex. von *Bledius erythropterus* Krtz. möchte Eppelsheim für eine monströse Form des *fracticornis* halten und ich bin nicht abgeneigt, ihm darin beizustimmen, da die Art seit 30 Jahren nicht wieder aufgefunden ist. Dr. G. Kraatz.

---

1) Stücke mit besonders langen Fld. aus Malaga lagen mir aus der Eppelsheim'schen Sammlung vor, dem ich auf seine Bitte mein typisches Stück von *castanoptera* zusandte; da die sicilianischen Stücke mit kürzeren Fld. auch rothbraune Fühler und Füße haben, so machen sie einen recht verschiedenen Eindruck von den spanischen, auch paßt die Beschreibung der sicilianischen *nigritula* geradezu nicht auf sie, da bei derselben die *elytra thorace paulo longiore* genannt worden; ich schlage daher für diese Form den Namen *macropepla* vor.